## Domino-Lurche – empfohlen zur Festigung etwa ab Klassenstufe 5 Lösungsblatt

Anfang	Die Lurche unterteilt man in	Froschlurche und Schwanzlurche.	Schwanzlurche sind	Salamander und Molche.	Zu den Froschlurchen gehören:
Kröten, Unken und Frösche.	Alle Lurche sind wechselwarm, das heißt,	ihre Körpertemperatur hängt von der Außen- temperatur. ab.		unter Steinen, in Erd- höhlen oder auf dem Grund der Gewässer.	Viele unserer Lurche sind
gefährdet oder vom Aussterben bedroht.	Unsere größte und häufigste Krötenart ist	die Erdkröte.	Man findet sie zum Beispiel in	Laubwäldern, Gärten, Parks, Feuchtgebieten.	Wenn im Frühjahr die Temperaturen auf etwa10 Grad steigen,
beginnt die Wandrung zu den Laicwässern.	Zur Paurung um klanimeri das Männchen	das weibliche Tier von hinten.	Das Weibchen legt 2000 bis 6000 Eier,	die vom Männ- chen sofort besamt werden.	Diese Form der Befruchtung nennt man
außere sc	ach 2 -3 Wo-chen :hlüpfen aus den ern	Kaulquappen. ren	schwimmen in wärme- Wasserschichten und ähren sich von	Algen.	nach 8-16 Wochen erfolgt die Meta- morphose, das ist
der Gestaltswandel.	Aus kiemenatmenden Wasserbewohnern werden	lungenatmende vierbeinige Landtiere.	Die 7-10mm großen Jungkröten verlassen	oft in großer Anzahl das Gewässer.	Diese Massen_ wanderung wird manchmal
als "Krötenregen" bezeichnet	Die Nahrung der Erdkröte besteht aus	Spinnen, Asseln, Würmern, Schnecken u.a.	Sie gehören daher in unserem Garten zu den	Helfern bei der Schädlings- bekämpfung.	Natürliche Feinde der Erdkröte sind:
Marder, Katzen Ringelnatter, Greif- und Rabenvögel.	Am stärksten jedoch wird sie bedroht durch	uns Menschen.	Immer mehr Feucht- gebiete werden	trockengelegt und zerstört.	Die meisten Erdkröten aber finden den Tod,
wenn sie auf dem Weg zu ihren Laich- gewässern Straßen überquere	Hier helfen vor allem	Krötenzäune Krötentunnel Straßensperrungen.	Nur wenn wir ihre Lebensräume erhalten,	können wir unsere Lurche wirksam schützen.	Ende amphibian ark





Schneide die 27 Doppelkästchen aus und ordne sie neu. Wenn du die richtige Reihenfolge gefunden hast, ergeben alle Kästchen nacheinander gelesen einen sinnvollen Text und vermitteln dir wichtige Informationen über die Lurche.

					7
Kröten, Unken und Frösche.	Alle Lurche sind wechselwarm, das heißt,	als "Krötenregen" bezeichnet.	Die Nahrung der Erdkröte besteht aus	Marder, Katzen Ringelnatter, Greif- und Rabenvögel.	Am stärksten jedoch wird sie bedroht durch
außere School	lach 2 -3 Wo-chen chlüpfen aus den iern	Krötenzäune Krötentunnel Straßensperrungen.	Nur wenn wir ihre Lebensräume erhalten,	Algen.	nach 8-16 Wochen erfolgt die Meta- morphose, das ist
uns Menschen.	Immer mehr Feucht- gebiete werden …	ihre Körpertemperatu hängt von der Außen- temperatur ab.		Salamander und Molche.	Zu den Froschlurcher gehören:
wenn sie auf dem Weg zu ihren Laich- gewässern Straßen überquere <b>n.</b>	Hier helfen vor allem	Spinnen, Asseln, Würmern, Schnecken u.a.	Sie gehören daher in unserem Garten zu den	können wir unsere Lurche wirksam schützen.	Ende amphibian ark
gefährdet oder vom Aussterben bedroht.	Unsere größte und häufigste Krötenart ist	Kaulquappen. ren	schwimmen in wärme- Wasserschichten und ähren sich von	oft in großer Anzahl das Gewässer.	Diese Massen_ wanderung wird manchmal
Anfang	Die Lurche unterteilt man in	Laubwäldern, Gärten, Parks, Feuchtgebieten.	Wenn im Frühjahr die Temperaturen auf etwa10 Grad steigen, 	unter Steinen, in Erd- höhlen oder auf dem Grund der Gewässer.	Viele unserer Lurch sind
ungenatmende vierbeinige Landtiere.	Die 7-10mm großen Jungkröten verlassen		Man findet sie zum Beispiel in	das weibliche Tier von hinten.	Das Weibchen legt 2000 bis 6000 Eier, 
der Gestaltswandel.	Aus kiemenatmenden Wasserbewohnern werden	trockengelegt . und zerstört.	Die meisten Erdkröten aber finden den Tod,	die vom Männ- chen sofort besamt werden.	Diese Form der Befruchtung nennt man
beginnt die Wan rung zu den Lai do wässern.		Helfern bei der Schädlings- bekämpfung.	Natürliche Feinde der Erdkröte sind:	Froschlurche und Sc hwanzlurche.	Schwanzlurche sinc

